

花柳病治療學

葉勁秋編

一 總論

現在世界以顯微鏡研究花柳病之病原凡三。1.梅毒。系螺旋菌。其形極細。狀若螺旋。兩端皆尖。一九〇五年為喬治丁霍夫及亞氏所發現。2.軟性下疳。系桿菌。形短而圓。兩端鈍圓。一八八九年為麥克雷氏所發現。3.淋病。系雙球菌。比桿菌益短而廣。形圓而中央微凹。一八七九年為尼塞爾所發現。三者病原各不相同。有感染此菌後。而又感染彼菌者。無一人因一種菌而併發數種者。更無以一種藥丸。藥粉。或藥水。而能統治花柳病者。

當十五世紀之末。微菌流行。蔓延全歐。病勢之猛。傳播之烈。從來未有。如此者約四十年。自此一逞。歐人其為恐怖。當時醫學知識淺薄。細菌學尚在萌芽。故對於花柳毒之原因。多屬臆測而不可憑信。略舉其說于左。以供參攷。

一、花柳病為淫蕩之結果。由天譴而起者。

報識常學醫社名又

格人及驗經識學有者持主

證保實切有用信求務版出

幸福園

辨別毒菌法

(李雲卿)

吾人日常所食之木耳。蘇菇。香菌等。都屬於菌類。但菌之中。有有毒者極多。必須辨別其有無毒質。否則危險堪虞。可不慎哉。今特辨別毒菌要點。分別書明於下。

以實本報。并乞閱者指教。

(A)有毒之菌。其色極鮮艷。如胭脂。色鮮紅。發惡。

(B)取菌和銀器。置水中煮之。銀器無黑色者。即係無毒菌有黑色者。係毒菌。

(C)毒菌亦有能發光者。如有夜光之菌類。

(D)菌之生於有毒樹上。即有毒者。其有無毒樹上。而有毒者。則厚朴本為無毒樹。而所附之菌。皆有毒。上述數種。均食菌者隨時注意。以免意外也可。(作者附註)

問答顏公才君

症屬三陰不足。濕熱入於帶脈。帶下約束之權。以致帶下黃赤。腰膝痠痛。治宜滋陰清火。化濕。

白帶身三錢 赤茯苓三錢 青皮各一錢 澤瀉三錢 生薑三錢 柏皮半錢 福澤瀉三錢 厚朴三錢 三錢 丹皮三錢 炒黃芩三錢 半川續斷三錢 震靈丹三錢包煎

本報主筆 朱振聲 楊志一 士醫

遷移通告

本醫室原在浙江路應診茲因舊址不敷應用特遷至雲南路掛號診治特此通告

此通告

幸福報

社儀署國

第一三八期

(日四念月九年八十國民)

分二洋售份每

口路南雲路馬三海上址館

定報價目

每三日出張 每五個月一元全 每一年二元五角 內本外埠一律 國外加郵費 廣告刊例 另刊 閱之元計每 期五方寸 開中長期 閱新

日用藥如用兵

▲當注重實驗及特效

夫醫家之用藥。猶將帥之用兵。藥所以治病。兵所以禦敵。其事雖異。而其理實相同也。然用兵之法。不外隨機應變。觀天時。察地理。在乎神而明之。為將帥者。得相機指揮。則所向必勝。而用藥之法。尤當重乎實驗。為醫者。須審察病情。參考藥性。酌量輕重。固不在奇品異術也明矣。觀夫古聖賢之製方必先推藥理之本源。究藥性之專能。察氣味之從逆。是以神農嘗百草。黃帝著素問。俾後人知苦酸辛鹹甘淡之味。升降浮沉之性。厚薄輕重之用。青黃五色之分。或氣一而味殊。或味同而氣異。合而言之。不可混用。分而言之。各有所能。本乎天者親上。本乎地者親下。輕清成象。重濁成形。清陽發腠理。濁陰走五臟。推理窮源。不脫五行生剋。故太昊首畫八卦。坎水離火。有既濟之功。神農始嘗百草。浮沉燥濕。定君臣之別。有佐使之功。有惡反。及吉凶利害補瀉之說。總之用藥之法。當先究其藥之特效。與夫病者老幼。受病之深淺。稟賦之厚薄。居養之貴賤。地氣天時之寒暑。慎重精詳。庶幾藥無不中。治無不愈矣。雖或不治而死者。則其病之所當然。而非醫之過也。

徵求現代名醫蹟驗案

本報自刊登上海名醫蹟驗案以來。備受讀者歡迎。惟思名醫未必限於上海一隅。而上海醫蹟驗案之徵求。凡現代名醫蹟驗案之徵求。於本報者。無不極誠歡迎。惟普通方案而無研究之價值者。恕不刊佈。各地名醫幸注意及之。附告本報刊登名醫蹟驗案。並不取費。惟每期收錄版費一元。作代錄錄版之用。此版將來可以奉酬。

刊日三福辛

報新 認爲 掛號 特准 郵政 中華

五五二